

Table 2. Urogenital symptoms and manifestations of sexual dysfunction, (n=120)

Indicators	Main group, n=60	Comparison group, n=60	
Diastasis recti	16 (26.7 %)	2 (3.3 %)	$\chi^2=11.05, p<0.001$
Vaginal laxity	13 (21.7 %)	2 (3.3 %)	$\chi^2=7.62, p<0.005$
Altered secretory function	22 (36.7 %)	8 (13.3 %)	$\chi^2=7.51, p<0.01$
Fecal incontinence	11 (18.3 %)	1 (1.7 %)	$\chi^2=7.50, p<0.01$
Obstructive defecation syndrome	9 (15.0 %)	1 (1.7 %)	$\chi^2=5.35, p<0.02$
Transient urinary incontinence	16 (26.7 %)	1 (1.7 %)	$\chi^2=13.43, p<0.001$
Perineal pain	19 (31.7 %)	2 (3.3 %)	$\chi^2=14.78, p<0.001$
Lower back and pelvic pain	34 (56.7 %)	11 (18.3 %)	$\chi^2=17.21, p<0.001$
Recurrent vaginal dysbiosis	29 (48.3 %)	8 (13.3 %)	$\chi^2=15.63, p<0.001$
Dyspareunia	19 (31.7 %)	6 (10.0 %)	$\chi^2=7.28, p<0.01$
Dysorgasmia	10 (16.7 %)	1 (1.7 %)	$\chi^2=6.41, p<0.01$
Sexual arousal disorder	13 (21.7 %)	2 (3.3 %)	$\chi^2=7.62, p<0.005$
Decreased sexual activity	23 (38.3 %)	7 (11.7 %)	$\chi^2=10.0, p<0.001$